Lommekort

På den næste side finder du forside og bagside til et lommekort til de af afdelingens læger der skal kunne screene og inkludere patienter i GODIF.

Sådan gør du:

1. Print siden i farver
2. Klip arkene over på midten (horisontalt)
3. Læg de halve ark med ryggen mod hinanden og tilpas ved at klippe det hvide rundt om de blå rammer væk.
4. Laminér siderne
5. Fold evt. sammen på midten til en lille folder med tekst på alle 4 sider

GODIF

Forsøgsmedicin:

Startdosis: 0.5 – 4 ml vurderet ved behandlende læge ud fra patientens kliniske tilstand. Herefter start infusionen på 2 ml/t. Hastigheden kan reguleres mellem 0 – 4 ml/t ud fra effekt og mål for negativ væskebalance.

Resuscitationsalgoritme:
Hvis patienten udvikler laktat ≥ 4,0 mmol/l, MAP < 50 mmHg eller marmorering ud over knæskaller skal forsøgsmedicinen pauseres.

Resusciter med boli af 250-500 ml krystalloid. Forsøgsmedicinen må først genopstartes når alle ovenstående parametre er væk, og når patienten vurderes stabil nok til at kunne tåle væsketræk.

Forsøgsmedicin trækkes online på www.cric.nu/godif/

GODIF

Inklusionskriterier til GODIF-studiet

- **Akut indlagt på ITA**
  OG
- **Mindst 18 år**
  OG
- **Klinisk stabil** (minimumskriterier: MAP > 50 mmHg, NA ≤ 0.20 mikrog/kg/min og laktat < 4,0 mmol/L)
  OG
- **Væskeophobning (minimum):** estimeres ud fra 4 parametre: kumulativ væskebalance, daglig væskebalance, ændringer i vægt og klinisk undersøgelse.

Højde	Mand	Kvinde
≤ 159 cm	+3000 ml	+2500 ml
160 – 169 cm	+3500 ml	+3000 ml
170 – 179 cm	+4000 ml	+3500 ml
180 – 189 cm	+4500 ml	+4000 ml
≥ 190 cm	+5000 ml	+4500 ml

Estimeret væskeophobning skal noteres i inkl. notatet.

GODIF

Praktisk info ved inklusion

1. **Gå til** www.cric.nu/godif
   - **Vælg** 'Screen, randomise, and enter data'
   - **Log på og vælg** 'Go to Patient Screening'
   - **Udfyld** screeningsformularen

2. **I Sundhedsplatformen (SP)/e-journal**
   - **Forskningsnotat:** indeholdende den estimerede væskeophobning og mål for væsketræk.
   - **Tilknyt forskningsprojekt i SP (kun Østdanmark):** fremsøg GODIF via forskningsikonet og udfyld felter.

2. **Samtykker:** Efter randomisering indhentes hurtigst muligt forsøgsværge og pårørende samtykke. Patient samtykke indhentes når patienten bliver habil.

OBS. Kvinder < 50 år skal have en negativ U-hCG eller P-hCG.

Dagligt væsketræk (minimum) indtil neutral væskebalance opnås.

Højde	Mænd	Kvinder
≤ 159 cm	-1300 ml	-1200 ml
160-169 cm	-1500 ml	-1400 ml
170-179 cm	-1700 ml	-1600 ml
180-189 cm	-1900 ml	-1800 ml
≥ 190 cm	-2000 ml	-1900 ml

Ordiner daglig vejning, forsøgsmedicin og det daglige negative væsketræk i journalen.

Neutral væskebalance vurderes ud fra følgende 4 parametre: kumulativ væskebalance, daglig væskebalance, ændringer i kropsvægt og klinisk undersøgelse af behandlende team og dokumenteres i journalen.

GODIF hotline:
+45 4829 6773